

natural^{ch}



"USO AGRÍCOLA"



natural^{ch}

Extracto de chocolate
Insecticida agrícola/Concentrado emulsionable
Composición Percentual

Ingredientes activos: Extracto de chocolate (Leguminosa mexicana) (Equivalente a 15-g de I.A./l a 20 °C)	0.15 %
Ingredientes inertes: Vehículo, Surfactante y Diluyente	99.85 %
Total	100.00%

Registro Sanitario RSCD INAC-01003G-0416-0017-0.11
Contenido neto: 1 L

Puede ser nocivo por el contacto con la piel.
Puede ser nocivo si se inhala.
Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Uso:
Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración

Distribuidor y Titular del registro por:

AZUL NATURAL, S. A. DE C.V.
Temas Anahuac No. 104-A Col. Botica,
C.P. 44795, Durango, Dgo. México
Tel. (449) 11 56 73

HECHO EN MÉXICO

PRECAUCIÓN



AZULNATURAL
BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA



Innovación natural para una agricultura sin límites



SINSECTICIDA EMULSIONABLE

Presentación: 500 ml, 1L y 20 L.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

natural ch® es un extracto orgánico constituido por alcaloides naturales con esqueleto de benzofenantridina y benzoisoquinolina.



MODO DE ACCIÓN

Producto con efecto de contacto contra insectos masticadores y chupadores de cuerpo duro y blando. Sus principios activos bloquean e inhiben el comportamiento y la búsqueda de comida de los insectos. Adicionalmente, destruyen su sistema nervioso central a través de la acción inhibitoria de acetilcolinesterasa sobre la sinapsis neuronal.



FITOTOXICIDAD

No ha demostrado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.



GARANTÍA

Almacenado en lugares bien ventilados y cerrados en su envase original, el producto tiene 2 años de garantía después de su elaboración. Por lo tanto, el fabricante, distribuidor y/o vendedor garantizan que el contenido de este envase inviolado y cerrado corresponde a las especificaciones de la etiqueta. Debido a la gran variedad de condiciones que se pueden encontrar durante el uso y manejo de este producto ni el fabricante y/o distribuidor dan implícita o explícitamente ninguna otra clase de garantía.



INCOMPATIBILIDAD

Por las características propias del producto, **natural ch**® no deberá ser aplicado con producto de pH alcalino.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agitar perfectamente durante 1 min el envase; colocar en el tanque de aplicación la mitad del volumen de agua y agregar la dosis de **natural ch**®. Completar con el volumen restante de agua corriente. Es necesario que haya agitación constante del producto durante la aplicación, cerciorándose de producir una aplicación homogénea, con el mejor cubrimiento posible.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Ingredientes activos

Extracto de Chicalote. (Argemone mexicana)
(Equivalente a 15 g de I.A./L 20 °C)

0.15 %

Ingredientes inertes

Vehículo, Surfactante y Diluyente

99.85 %

Total

100 %

LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ INDICA ÚNICAMENTE EL PRODUCTO ESPECÍFICO Y PUEDE NO SER VÁLIDO SI EL PRODUCTO ES USADO EN COMBINACIÓN CON ALGÚN OTRO MATERIAL O PROCESO. **AZUL NATURAL, S. A. DE C. V.** SE DESLINDA DE CUALQUIERA Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO ALGÚN OTRO RESULTADO OBTENIDO O PRESENTADO POR ALGÚN USO DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACIÓN AQUÍ INDICADA.

naturalch



Innovación natural para una agricultura sin límites

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO		
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía (0)	Mosquita blanca	Bemisia tabaci	0.75	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 100 L de agua/ha
Chile, Tomate de cáscara, Berenjena, Jitomate, Papa, Jitomate, Tabaco (0)	Paratrioza	Bactericera cockerelli	0.5-1.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten las primeras poblaciones, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha
Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas, Col, Mostaza, Colza, Colinabo (0)	Pulgón cenizo	Brevicoryne brassicae	0.5-1.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando en el cultivo se presenten las primeras poblaciones del pulgón cenizo, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha
Trigo, Sorgo, Avena, Maíz, Cebada, Centeno, Arroz, Triticale (0)	Pulgón amarillo	Methopolophium dirhodum, Melanaphis sacchari	0.5-1.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten las primeras poblaciones, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta. Volumen de aplicación 350-550 L de agua/ha
Nogal (SL)	Pulgón amarillo con alas de márgenes negros	Monellia caryella	1.5 – 2.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten las primeras poblaciones. Volumen de aplicación 510 - 910 L de agua/ha

Calibración del equipo: Siempre calibre el equipo de aplicación.

Tiempo de re-entrada: 0 día.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ INDICA ÚNICAMENTE EL PRODUCTO ESPECÍFICO Y PUEDE NO SER VÁLIDO SI EL PRODUCTO ES USADO EN COMBINACIÓN CON ALGÚN OTRO MATERIAL O PROCESO. **AZUL NATURAL, S. A. DE C. V.** SE DESLINDA DE CUALQUIERA Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO ALGÚN OTRO RESULTADO OBTENIDO O PRESENTADO POR ALGÚN USO DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACIÓN AQUÍ INDICADA.

naturalch